

Inscríbese para obtener ahorros y apoyo

Y conéctese con un especialista de habla hispana



OFERTA DE COPAGO DE

\$10

Entresto®
(sacubitril/valsartan) tablets
24/26mg • 49/51mg • 97/103mg

BIN **601341**
PCN **OHCP**
GRP _____
ID _____

LOS PACIENTES CON SEGURO PRIVADO PAGAN TAN SOLO \$10 POR UN SUMINISTRO DE HASTA 90 DÍAS.*

No válido con Medicare, Medicaid ni ningún otro programa federal o estatal. Se aplican limitaciones adicionales.

Para su comodidad, también puede descargar los detalles de su copago en Apple Wallet o Google Pay.

NOTA: Una vez que se inscriba, su registro de copago se renovará automáticamente al comienzo de cada año calendario (límite anual de \$4100).

OFERTA DE PRUEBA GRATUITA DE 30 DÍAS

Entresto®
(sacubitril/valsartan) tablets
24/26mg • 49/51mg • 97/103mg

BIN **601341**
PCN **OHS**
GRP **OH7143151**
ID **M63100136185**

DESCUBRIR SI ENTRESTO® ES ADECUADO PARA USTED.†

Para todos los pacientes (independientemente del seguro) al iniciar el tratamiento. Se aplican limitaciones.

Este vale sirve para una prueba gratis de ENTRESTO por 30 días (un máximo de 60 pastillas; **uso único**) sin costo alguno para usted.

Preactivado y listo para llevarlo a su farmacia con una receta válida de ENTRESTO.

Consulte los Términos y condiciones completos para conocer estas ofertas.



INSCRÍBASE EN UN PROGRAMA GRATUITO DE APOYO AL ESTILO DE VIDA Y AL TRATAMIENTO.

Obtenga una variedad de recursos de apoyo que lo ayudarán mientras toma ENTRESTO.

NOTA: Debe tener 18 años o más para inscribirse en el programa ENSPIRE de ENTRESTO.

CÓMO INSCRIBIRSE

Visite **ENTRESTO.COM**

Haga clic en la pestaña "Savings and Support" (Ahorros y apoyo) y luego en "Sign Up for Savings and Support" (Inscríbese para ahorros y apoyo).

La información en Entresto.com solo está disponible en inglés.

o bien

Envíe un mensaje de texto con la palabra **SIGNUP** al

470-264-9643† para obtener ahorros a través de su teléfono móvil.

NOTA: Solo disponible para la inscripción en el copago.

o bien

Llame al **1-888-ENTRESTO (1-888-368-7378)**

(de lunes a viernes, excepto días festivos, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. hora del este).

Nuestros especialistas hablan español y están esperando para comunicarse con usted.

***Términos y condiciones de copago:** Se aplican limitaciones. Válido solo para quienes tienen seguro privado. El programa incluye la tarjeta de copago, la tarjeta de pago (si corresponde) y descuentos, con un límite combinado anual de \$4100. El paciente es responsable de cualquier costo una vez que se alcanza el límite en un año calendario. El programa no es válido (i) con Medicare, Medicaid, TRICARE, VA, DoD ni ningún otro programa de atención médica federal o estatal; (ii) cuando el paciente no usa en absoluto la cobertura del seguro; (iii) cuando el plan de seguro del paciente reembolsa el costo total del medicamento; o (iv) cuando el seguro del paciente es exclusivamente para beneficio de los pacientes y tiene como objeto acreditarse para el pago de máximos y obligaciones de bolsillo del paciente, incluidos copagos, coseguro y deducibles que correspondan. El programa no es válido donde la ley lo prohíbe. El paciente no debe solicitar el reembolso por el valor recibido mediante este programa a otras partes, incluidos cualquier programa o plan de seguro médico, cuenta de gastos flexibles o cuenta de ahorros para atención médica. El paciente es responsable de cumplir con todas las limitaciones y los requisitos correspondientes de su plan médico en relación con el uso del programa. Válido solo en Estados Unidos y Puerto Rico. Es posible que se apliquen limitaciones en MA y CA. Este programa no es un seguro médico. El programa no puede combinarse con ningún descuento, cupón u oferta de terceros. Es posible que se solicite comprobante de compra. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar el programa e interrumpir el apoyo en cualquier momento, sin previo aviso.

Es posible que algunos planes de salud no acepten una tarjeta para copago. Póngase en contacto con su proveedor del seguro para averiguar si su plan permite el uso de tarjetas para copago.

***Términos y condiciones de la prueba gratuita:** Sin obligación de compra. Envíe el reclamo a IQVIA usando el BIN n.º 601341. Esta prueba gratis no es un seguro médico. No válido donde esté prohibido por ley. Producto entregado conforme a los términos y condiciones del vale. Los reclamos no deberán enviarse a ningún tercero pagador público o privado ni a ningún programa de atención médica federal o estatal para obtener un reembolso. Válido solo en EE. UU. y Puerto Rico. Oferta no válida si se reproduce o se envía a cualquier otro pagador. Es ilegal que cualquier persona venda, compre o intercambie, u ofrezca vender, comprar, intercambiar o falsificar el vale. Es propiedad de Novartis Pharmaceuticals Corporation y se deberá devolver si se lo solicita. Novartis Pharmaceuticals Corporation se reserva el derecho a rescindir, revocar o enmendar la oferta sin previo aviso.

†Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos.

Consulte INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE ENTRESTO en la página siguiente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE ENTRESTO®

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ENTRESTO?

ENTRESTO puede dañar o causar la muerte a su bebé en gestación. Hable con su médico acerca de otras formas de tratar la insuficiencia cardíaca si planea quedar embarazada. Informe a su médico de inmediato, si queda embarazada durante el tratamiento con ENTRESTO.

¿QUÉ ES ENTRESTO?

ENTRESTO es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar a adultos con insuficiencia cardíaca duradera (crónica) para ayudar a reducir el riesgo de muerte y hospitalización. ENTRESTO funciona mejor cuando el corazón no puede bombear una cantidad normal de sangre al cuerpo. También se usa para tratar a ciertos niños de 1 año de edad o más que tienen insuficiencia cardíaca sintomática.

Se desconoce si ENTRESTO es seguro y eficaz en niños menores de 1 año de edad.

No tome ENTRESTO si:

- Es alérgico a cualquiera de los ingredientes de ENTRESTO.
- Ha tenido una reacción alérgica, como hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta (angioedema) o dificultad para respirar mientras tomaba un tipo de medicamento llamado inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) o bloqueador del receptor de la angiotensina II (BRA).
- Toma un medicamento inhibidor de la ECA. **No tome ENTRESTO durante al menos 36 horas antes o después de tomar un medicamento inhibidor de la ECA.** Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar ENTRESTO si no está seguro de si toma un medicamento inhibidor de la ECA.
- Tiene diabetes y toma un medicamento que contiene aliskiren.

Antes de tomar ENTRESTO, informe a su médico todas sus afecciones, incluso si:

- tiene antecedentes de angioedema hereditario.
- tiene problemas renales o hepáticos.
- tiene diabetes.
- está embarazada o planea quedar embarazada. Consulte “¿Cuál es la información más importante acerca de ENTRESTO que debo conocer?”.
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si ENTRESTO pasa a la leche materna. No debe amamantar durante el tratamiento con ENTRESTO. Usted y su médico deben decidir si tomará ENTRESTO o amamantará.

Infórmele al médico acerca de todos los medicamentos que recibe, incluidos los de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. El uso de ENTRESTO con otros medicamentos determinados puede hacer que estos se afecten entre sí. El uso de ENTRESTO con otros medicamentos puede causar efectos secundarios graves. Informe especialmente a su médico si toma suplementos de potasio o sustitutos de sal, fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), litio u otros medicamentos para la presión arterial alta o problemas cardíacos, como los inhibidores de la ECA, BRA o aliskiren. Haga una lista de sus medicamentos para mostrárselas al médico y al farmacéutico cuando le den un nuevo medicamento.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ENTRESTO? ENTRESTO podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- Consulte “¿Cuál es la información más importante acerca de ENTRESTO que debo conocer?”.
- **Reacciones alérgicas graves que causan hinchazón del rostro, los labios, la lengua y la garganta (angioedema), que pueden provocar problemas para respirar y la muerte.** Solicite asistencia médica de emergencia inmediatamente si tiene síntomas de angioedema o dificultad para respirar. No vuelva a tomar ENTRESTO si ha tenido angioedema durante el tratamiento con ENTRESTO.
- Las personas de raza negra que toman ENTRESTO pueden tener un mayor riesgo de tener angioedema que las personas que no son de raza negra y toman ENTRESTO.
- Las personas que han tenido angioedema antes de tomar ENTRESTO pueden tener un mayor riesgo de tener angioedema que las personas que no han tenido angioedema antes de tomar ENTRESTO. Consulte “No tome ENTRESTO si:”
- **Presión arterial baja (hipotensión).** La presión arterial baja es frecuente durante el tratamiento con ENTRESTO. El riesgo de tener presión arterial baja es mayor si también toma píldoras de agua (diuréticos). Llame a su médico si se mareo o tiene aturdimientos, o si desarrolla fatiga extrema.
- **Problemas renales.** Los problemas renales son frecuentes durante el tratamiento con ENTRESTO y pueden ser graves y provocar insuficiencia renal. El médico controlará su función renal durante el tratamiento con ENTRESTO.
- **Aumento de la cantidad de potasio en la sangre (hiperpotasemia).** El aumento de los niveles de potasio en sangre es frecuente durante el tratamiento con ENTRESTO. El médico le controlará el nivel de potasio en sangre durante el tratamiento con ENTRESTO.

Los efectos secundarios más frecuentes también incluyen tos y mareos.

Es posible que su médico tenga que reducir su dosis o interrumpir temporal o permanentemente el tratamiento si desarrolla ciertos efectos secundarios o si tiene cambios en su función renal o aumento de los niveles de potasio en sangre durante el tratamiento con ENTRESTO.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ENTRESTO. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

Se aconseja que se informe a la FDA de los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al [1-800-FDA-1088](tel:1-800-FDA-1088).

Esta información no es exhaustiva. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico, visite www.entresto.com para consultar la etiqueta del producto aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) o llame al [1-888-ENTRESTO](tel:1-888-ENTRESTO).

